

✓ رده بندی فارماکولوژیک : مشتق نیکوتین آمید

✓ رده بندی درمانی : آنتی بیوتیک، ضد سل

✓ رده بندی مصرف در حاملگی : گروه D

△ اشکال دارویی موجود :

★ Tablets: 250 mg

⊖ اندیکاسیون های تجویز، راه مصرف، دوز اثر دارو :

- درمان سل فعال (در صورت عدم درمان با داروهای خط اول:
(1000-500mg، خوراکی روزانه در دوزهای منقسم

نکته: این دارو با دیگر داروهای ضد سل، تجویز می شود.

⊖ کنتر اندیکاسیون : حساسیت مفرط به دارو، اختلال شدید کبدی

⊙ موارد احتیاط : اطفال، حاملگی، شیردهی

Ⓢ عارضه جانبی :

CNS : اختلالات روانی، نوریت محیطی

GI : تهوع، استفراغ

CV : هیپوتانسیون ارتوستاتیک

⑤ **تداخلات دارویی :** مصرف همزمان این دارو، عوارض جانبی سایر داروهای ضد سل، را افزایش می دهد.
در صورت مصرف همزمان این دارو با سیکلوسرین، امکان بروز تشنج وجود دارد.

□ **مراقبت های پرستاری و توجهات ویژه :**

- ۱) بهتر است دارو بعد از غذا تجویز شود.
 - ۲) بررسی عملکرد کبدی بیمار، در طی درمان (هر ۳-۴ هفته) ضروری است
 - ۳) در بیمار مبتلا به دیابت، بررسی قند خون لازم است.
- ◇ **مصرف در شیر دهی و کودکان :** در طی درمان، شیردهی باید قطع گردد.

☒ **آموزش به بیمار و خانواده :**

- ۱) بیمار باید طبق دستور پزشک، دوزاژ و طول مدت درمان را رعایت نماید.
- ۲) بیمار باید در صورت رخ دادن یرقان، ادرار تیره، مدفوع بی رنگ به پزشک اطلاع بدهد.