

✓ رده بندی فارماکولوژیک : سولفونامید

✓ رده بندی درمانی : آنتی بیوتیک واژینال ، سولفونامید .

✓ رده بندی مصرف در حاملگی : گروه D

△ اشکال دارویی موجود :

- ★ Sulfathiazale Sulfacetamide Sulfabendazol
- ★ Vaginal cream : 3.4% 2.8% 3.7%
- ★ Vaginal Tablets : 172.5 mg 143.75 mg 184 mg

⊖ اندیکاسیون های تجویز، راه مصرف، دوز اثر دارو :

التهاب ولوواژینال ناشی از کاندیدا آلبیکانس تریکوموناس واژینالیس و هموفیلوس واژینالیس (گاردنلاواژینالیس)

• **کرم واژینال** بالغین: ۵-۴ g (یک اپلیکاتور) از راه واژینال دو بار در روز قبل

از خواب و بعد از بیداری به مدت ۶-۴ روز استعمال می شود . سپس مقدار مصرف به نصف یا یک چهارم کاهش می یابد .

• **قرص واژینال** بالغین: یک قرص از راه واژینال دوبار در روز ، قبل از خواب و

بعد از بیدار شدن از خواب به مدت ۱۰ روز استعمال می شود . در صورت لزوم این دوز تکرار می شود .

Ⓢ عارضه جانبی :

G.u : خارش ، سوزش ، راش ، قرمزی و تورم

- (۱) به منظور جلوگیری از بروز مجدد عفونت ، همسر بیمار باید از کاندوم استفاده نماید . همسر بیمار نیز ممکن است به درمان نیاز داشته باشد . در صورت مقاربت در طول درمان . استعمال دارو را ادامه دهید .
- (۲) در صورت آبستنی ، قبل از استفاده از اپلیکاتور با پزشک مشورت کنید .
- (۳) دوره درمان را حتی در صورت شروع قاعدگی کامل کنید .
- (۴) در صورتی که یک نوبت استعمال دارو را فراموش کردید ، به محض به یاد آوردن آن را استعمال کنید ولی اگر زمان استعمال نوبت بعدی فرا رسیده باشد ، از استعمال نوبت فراموش شده خودداری کنید .
- (۵) قبل از استعمال نوبت بعدی ، مهبل را بشوئید .
- (۶) در صورتی که پس از چند روز درمان بهبود مشاهده نشد ، به پزشک مراجعه کنید .