

اسپیرونولاکتون

Spironolacton ® Aldactone

گروه درمانی : دیورتیک نگهدارنده پتاسیم

اشکال دارویی :

Tablets: 25mg, 100mg

راه تجویز : Po

اندیکاسیون

(۱) ادم

(۲) هیپرتانسیون

۳) هیپوکالمی ناشی از دیورتیک. بالغین: 25-200mg خوراکی در روز در دوزهای منقسم

کنتراندیکاسیون

- ۱) آنوری
- ۲) نارسایی کلیوی حاد یا پیشرونده
- ۳) مصرف همزمان آمیلوراید یا تریامترن

عوارض جانبی

- ۱) آتاکسی
- ۲) کنفوزیون
- ۳) کرامپ شکمی
- ۴) ناتوانی حفظ نعوظ
- ۵) دهیدراتاسیون
- ۶) هیپوناترمی

(۷) هیرسوتیسم

(۸) کهیر

(۹) ژنیکوماستی

توجهات پرستاری

(۱) دارو با غذا خورده شود تا جذب تقویت شود.

(۲) دارو را در برابر نور محافظت کنید

(۳) تا دوزهای 200mg در روز برای درمان هیرسوتیسم بکار رفته است

(۴) مراقب اسیدوز متابولیک هیپرکلرمیک باشید.

(۵) در صورت مصرف دارو به تنهایی ممکن است اثر دیورتیک با ۲-۳ روز تاخیر ظاهر شود.

(۶) بروز اثرات آنتی هیپرتانسیو دارو ممکن است تا ۲-۳ هفته به تاخیر بیافتد.