

وراپامیل

Verapamil

گروه درمانی : ضد آنژین، ضد هیپرتانسیون، ضد آریتمی

اشکال دارویی :

Injection: 5mg/2ml

Tablets: 40mg, 80mg

Tablets (sustained - release): 240 mg

راه تجویز : Slow IV/Po

اندیکاسیون

۱) درمان آنژین پرینژنیتال یا وارینت یا آنژین مزمن ناپایدار یا پایدار

۲) تاکی آریتمی فوق بطنی: 5-10mg وریدی طی ۲ دقیقه، در صورت عدم پاسخ دوز دوم به مقدار 10mg را ۳۰-۱۵ دقیقه بعد از دوز اولیه تزریق کنید

۳) کنترل ریتم بطنی در بیماران دیژیتالیزه مبتلا به فلوتریا فیبریلاسیون مزمن دهلیزی

۴) پیشگیری از تاکیکاردی فوق بطنی حمله‌ای تکرار شونده

۵) هیپرتانسیون

عوارض جانبی

۱) رخوت

۲) سردرد

۳) بلوک AV

۴) برادیکاردی

۵) ادم ریوی

۶) هیپوتانسیون موقت

۷) آسیتول بطنی

۸) فیبریلاسیون بطنی

توجهات پرستاری

- ۱) در این بیماران دوز وراپامیل را کاهش دهید، اختلال کبدی یا کلیوی، نارسایی قلبی شدید، مصرف همزمان بتابلوکرها
- ۲) مصرف دیسوپیرامید را از ۴۸ ساعت قبل از شروع تا ۲۴ ساعت بعد از توقف مصرف وراپامیل، متوقف کنید.
- ۳) طی تجویز وریدی دارو، EKG و فشار خون باید به طور پیوسته پایش شوند.
- ۴) در صورت مصرف همزمان با کاربامازپین یا دیگوکسین، دوز کاربامازپین یا دیگوکسین را تا ۵٪ کاهش دهید. طی درمان طولانی مدت با دیگوکسین، مراتب بلوک AV و برادیکاردی باشید.