

ویتامین K_۱

Vitamin K_۱®
Phytonadione

گروه درمانی : جلوگیری کننده از اختلالات انعقادی
اشکال دارویی :

Coated Tablets:10mg
Injection:1mg/0.5ml
Injection Solution:10mg/ml

راه تجویز : IV/Po

اندیکاسیون

۱) هیپوپروترومبینمی ثانویه به سوء جذب ویتامین K و یا مصرف داروها. بالغین: 5-10mg از راه خوراکی یک یا دو بار در روز

کنتراندیکاسیون

(۱) حساسیت مفرط به هریک از ترکیبات ویتامین K

(۲) اختلال عملکرد کبد

عوارض جانبی

(۱) سردرد

(۲) سرگیجه

(۳) هیپوتانسیون

(۴) دیس ریتمی های قلبی

(۵) برونکواسپاسم

(۶) آنافیلاکسی

(۷) کرنیکتروس

(۸) آنمی همولیتیک

توجهات پرستاری

(۱) محلول فیتونادیون نسبت به نور حساس است، محلول را در ظروف محافظت شده در برابر نور به وسیله آلومینیوم قرار دهید.

(۲) پاسخ درمانی به وسیله کوتاه شدن زمان پروترومبین، خونریزی و انعقاد تعیین می‌شود.

(۳) دوزاژ، دفعات و دوره درمان براساس زمان پروترومبین و پاسخ بالینی فرد تعیین می‌شود.