

وارفارین

Warfarin ® Coumadin

گروه درمانی : داروی ضد انعقاد

اشکال دارویی :

Tablets: 2.5mg, 5mg

راه تجویز : Po

اندیکاسیون

(۱) آمبولی ریوی

(۲) ترومبوز ورید عمقی (DVT)

(۳) بیماری روماتیسمی قلبی با آسیب دریچه‌ای

۴) آریتمی‌های دهلیزی. بالغین: شروع با 2-5mg خوراکی، سپس به صورت روزانه دوز مطلوب را با توجه به PT و INR تنظیم کنید.

کنتراندیکاسیون

- ۱) دوران بارداری
- ۲) بیماران مستعد به خونریزی
- ۳) هیپرتانسیون شدید کنترل شده
- ۴) تهدید به سقط
- ۵) اکلامپسی
- ۶) کمبود ویتامین K

عوارض جانبی

- ۱) تب
- ۲) بی‌اشتهایی

- (۳) استفراغ
- (۴) هماچوری
- (۵) خونریزی
- (۶) هپاتیت
- (۷) راش
- (۸) کهیر

توجهات پرستاری

- (۱) در صورت افزایش بیش از حد INR، PT یا وقوع خونریزی‌های جزئی، عدم مصرف یک یا دو دوز اغلب برای رفع عارضه کافی است.
- (۲) در بیمار مبتلا به کمبود پروتئین، یا شک به وجود آن، درمان همزمان با هپارین برای ۴-۷ روز می‌تواند خطر نکروز را کاهش دهد.
- (۳) به بیمار بگوئید بروز هر گونه خونریزی یا کبودی غیر معمول را سریعاً گزارش کند.

(۴) به بیمار توصیه کنید از مصرف مواد غذایی حاوی پتاسیم به مقدار زیاد خودداری کند، این مواد عبارتند از مارچوبه، کلم، کاهو، اسفناج، شاهی، چای سبز، جگر گوساله، گوشت خوک، گوجه فرنگی و کلم