

آ.اس.آ

## Acetyl Salicylic Acid (ASA)

گروه درمانی : ضد درد غیر مخدر، ضد تب، ضد التهاب، ضد پلاکت  
اشکال دارویی :

Tablets: 80mg(E.C), 100mg(chewable),  
100mg(M.C), 325mg(E.C), 325mg(scored),  
325mg(effervescent), 500mg(M.C)  
Suppositories: 325mg

راه تجویز : Rectal/Po

اندیکاسیون

- ۱) آرتريت. بالغين: 2.4-3.6gr: خوراکی در روز
- ۲) آرتريت نوجوانان
- ۳) درد خفيف يا تب
- ۴) حملات ايسکميک گذرا (TIA)
- ۵) تب روماتیسمی
- ۶) پريکاردیت به دنبال MI
- ۷) کاشت استنت
- ۸) پیشگیری از انسداد مجدد عروق کرونر بعد از جراحی

## کنتراندیکاسیون

- ۱) کودکان مبتلا به آبله مرغان یا علایم سرماخوردگی (خطر سندرم Ray)
- ۲) کمبود G6PD
- ۳) اختلالات خونریزی دهنده مثل هموفیلی
- ۴) بیماری Von Willebrand

## توجهات پرستاری

- (۱) تماس قرص‌های فاقد پوشش با مخاط دهان باعث زخم دهان می‌شود.
- (۲) قرص‌های پوشش‌دار در درمان حالت‌های مزمن مناسب هستند و در حالت حاد.
- (۳) مصرف آسپرین یک هفته قبل از عمل جراحی قطع گردد.
- (۴) مصرف خود سرانه دارو نباید بیش از ۱۰ روز به طول انجامد.
- (۵) با توجه به مسمومیت حاد در کودکان، دور از دسترس اطفال قرار داده شود.
- (۶) در حساسیت بیمار به رنگ تارترازین نباید از آسپرین استفاده شود.
- (۷) در صورت مصرف طولانی مدت آسپرین علائمی مثل پتشی، خونریزی لثه و علائم خونریزی گوارشی را به بیمار گوشزد نمائید.
- (۸) دارو به همراه یا بعد از غذا به همراه یک لیوان پر آب (240ml) مصرف گردد تا از عبور آن از مری اطمینان حاصل گردد.