

آلبومین

Albumin (Human)

گروه درمانی : پروتئین پلاسما، مشتق خون

اشکال دارویی :

Injection solution: 5%(100ml), 20%(50ml)

راه تجویز : IV Infusion

اندیکاسیون

(۱) شوک: حداکثر 250mg در طی ۴۸ ساعت تجویز شود.

(۲) سوختگی‌ها

(۳) هیپروتینمی

(۴) هیپر بیلیروبینمی

کنتر اندیکاسیون

(۱) حساسیت مفرط به دارو

(۲) ابتلا به هیپرتانسیون

(۳) عفونت شدید ریوی

(۴) آنمی مزمن شدید

عوارض جانبی

(۱) تب

(۲) سردرد

(۳) هیپوتانسیون

(۴) تاکی کاردی

(۵) افزایش بار عروقی بعد از انفوزیون

(۶) افزایش بزاق

(۷) تهوع و استفراغ

(۸) تنگی نفس

(۹) ادم ریوی

توجهات پرستاری

(۱) قبل از درمان بیمار باید کاملاً هیدراته گردد.

(۲) محلول باز شده تا ۴ ساعت قابل مصرف می باشد.

(۳) محلول کدر یا حاوی رسوب دور ریخته شود.

(۴) آلبومین را می توان با محلول N/S یا D5w در صورت لزوم رقیق نمود.

(۵) برای انفوزیون ازست دارای فیلتر ۵ میکرون به بالا استفاده نمود.

(۶) هر لیتر محلول آلبومین حاوی $130-160\text{ mEq}$ سدیم است.

(۷) در طی درمان، میزان دریافت و برون ده مایع، سطوح همتوکریت، هموگلوبین، پروتئین سرم و الکترولیت ها را چک کنید.

۸) سطح آلبومین پلاسما را در حد 2-3g/dl و یا فشار انکوتیک را در حد 20 نگهدارید.