

آلپرازولام

Alprazolam ® Xanax

گروه درمانی : ضد اضطراب، بنزودیازین

اشکال دارویی :

Tablets: 0.5mg, 1mg

راه تجویز : Po

اندیکاسیون

۱) اضطراب. بالغین: 0.25-0.5mg خوراکی سه بار در روز

۲) اختلال هراس

کنتراندیکاسیون

- (۱) حساسیت مفرط به دارو یا سایر بنزودیازپین‌ها
- (۲) گلوکوم زوایه بسته حاد
- (۳) مصرف توام با یکی از داروهای ضد قارچ آزول

عوارض جانبی

- (۱) بی‌قراری و اضطراب
- (۲) تغییر لیبیدو
- (۳) کنفوزیون
- (۴) افسردگی
- (۵) دیسکنزی
- (۶) بی‌خوابی
- (۷) اختلال حافظه
- (۸) خشکی دهان
- (۹) تاری دید

توجهات پرستاری

- ۱) علایم محرومیت عبارتند از تشنج، صرع پایدار، اختلال تمرکز، کرامپ یا پرش عضلات، اسهال، تاری دید.
- ۲) دارو ممکن است باعث هیجان پارادوکسیکال، تحریک و پرخاش حاد گردد.
- ۳) در سالمندان و بیماران با عملکرد کبدی یا کلیه‌ای مختل، دوزهای پایین‌تر موثر است.
- ۴) خطر وابستگی به دارو در مصرف طولانی مدت را تذکر دهید.
- ۵) به بیمار تذکر دهید تغییر وضعیت ناگهانی از خوابیده به نشسته و ایستاده می‌تواند موجب احساس گیجی شود.
- ۶) دارو باید در محل خنک و دور از نور مستقیم نگهداری شود.