

# آمیلوراید هیدروکلراید

## Amloride Hydrochloride

گروه درمانی : دیورتیک، ضد فشار خون

اشکال دارویی :

Tablets: 5mg

راه تجویز : Po

اندیکاسیون

۱) هیپرتانسیون، ادم ناشی از نارسایی قلبی، معمولاً در بیمارانی که دیورتیک تیازیدی یا دیورتیک دفع کننده پتاسیم دیگری دریافت می کنند: معمولاً 5mg خوراکی در روز که می توان در صورت نیاز تا 10mg در روز آن را افزایش داد.

(۲) پلی‌اوری ناشی از لیتیوم: 5-10mg خوراکی دو بار در روز

## کنتراندیکاسیون

(۱) حساسیت مفرط به دارو

(۲) مصرف همزمان با سایر دیورتیک‌های نگهدارنده پتاسیم

(۳) سطح پتاسیم سرم بیش از 5.5 mEq/L

(۴) آنوری

(۵) نارسایی حاد یا مزمن کلیوی

(۶) ن فروپاتی دیابتی

## عوارض جانبی

(۱) گیجی

(۲) آنسفالوپاتی

(۳) خستگی

(۴) هیپوتانسیون ارتواستاتیک

(۵) بی‌اشتهایی

(۶) یبوست

(۷) ناتوانی جنسی

(۸) آنمی آپلاستیک

## توجهات پرستاری

(۱) مراقب شواهد هیپرکالمی از جمله پarestزی، ضعف عضلانی، خستگی، فلج شل اندام‌ها، برادیکاردی، شوک و اختلالات EKG باشید.

(۲) به بیمار هشدار دهید از مصرف غذاهای غنی از پتاسیم خودداری کنید.

(۳) دارو را می‌توان با یا بدون غذا مصرف کرد.

(۴) در بیماران دیابتی بعد از تست تحمل گلوکز وریدی، خطر هیپرکالمی با آمیلوراید بالاست، لذا حداقل ۳ روز قبل از تست دارو متوقف شود.

(۵) آمیلوراید اغلب همراه با دیورتیک‌های موثر تجویز می‌شود.