

آملودیپین

Amlodipine Besylate

گروه درمانی : ضد آنژین، ضد هیپرتانسیون

اشکال دارویی :

Tablets:5mg

راه تجویز : Po

اندیکاسیون

۱) هیپرتانسیون: بالغین، شروع با 2.5-5mg خوراکی دو بار در روز، حداکثر دوز تا 10mg در روز

۲) آنژین پایدار

۳) آنژین اسپاسم عروقی (آنژین پرینزمیتال یا Variant): بالغین
5-10mg خوراکی در روز

کنتراندیکاسیون

- ۱) حساسیت به دارو
- ۲) تنگی آئورت
- ۳) نارسایی قلبی
- ۴) بیماری شدید کبدی

عوارض جانبی

- ۱) گیجی
- ۲) خستگی
- ۳) سردرد
- ۴) ادم
- ۵) گرگرفتگی

(۶) درد شکم

(۷) تهوع

(۸) درد عضلانی

(۹) خارش پوست

(۱۰) راش

توجهات پرستاری

(۱) تاثیر این دارو تدریجی است لذا بروز هیپوتانسیون حاد با مصرف آملودیپین محتمل نیست ولی با این حال در تنگی شدید آئورت تجویز محتاطانه صورت گیرد.

(۲) فشار خون را دقیقاً بخصوص در شروع درمان با این دارو پایش کنید.

(۳) این دارو نباید با گریپ فروت خورده شود.

(۴) علائم نارسایی قلبی از قبیل ورم دست‌ها و احساس تنگی نفس را گزارش نماید.

(۵) این دارو ممکن است در مبتلایان به بیماری شدید انسدادی عروق کرونر با دریافت دوز داروی بلوک کننده

کانال کلسیم دچار افزایش تعداد، مدت و زمان و شدت آنژین یا حتی AMI گردد.