

کاپتوپریل

Captopril

گروه درمانی : ضد هیپرتانسیون، درمان کمکی در نارسایی قلبی
اشکال دارویی :

Tablets: 25mg, 50mg

راه تجویز : Po

اندیکاسیون

(۱) هیپرتانسیون خفیف تا شدید

(۲) ادم ایدیوپاتیک

(۳) پدیده رینود

(۴) نارسایی قلبی

(۵) پیشگیری از نوروباتی دیابتی

(۶) اختلال کارکرد بطن چپ بعد از MI

کنتراندیکاسیون

(۱) حساسیت مفرط به دارو و سایر مهارکننده‌های ACE

(۲) نارسایی کلیوی

(۳) تنگی شریان کلیوی

(۴) SLE

عوارض جانبی

(۱) گیجی

(۲) غش

(۳) خستگی

(۴) آنژین صدری

(۵) هیپوتانسیون

(۶) تاکیکاردی

(۷) درد شکم

(۸) بی‌اشتهایی

(۹) یبوست

(۱۰) خشکی دهان

(۱۱) هیپرکالمی

توجهات پرستاری

(۱) دارو یک ساعت قبل از غذا مصرف شود.

(۲) برای به حداقل رساندن هیپوتانسیون ارتواستاتیک به بیمار گوشزد نمائید از تغییر ناگهانی وضعیت پرهیز نماید.

(۳) دارو می‌تواند علایم هیپوگلیسمی و هیپوتیروئیدی را مخفی نگه دارد و منجر به طوفان تیروئیدی در مبتلایان به هیپوتیروئیدی گردد.

(۴) دو تا سه روز قبل از شروع کاپتوپریل، درمان با دیورتیک را متوقف کنید تا از بروز هیپوتانسیون پیشگیری شود و اگر دارو

نتوانست فشار خون را کنترل کند، مجدداً دیورتیک را شروع کنید.

(۵) قبل از تجویز دارو در نارسایی قلبی باید دوزاز گلیکوزیدهای قلبی، دیورتیک‌ها و مهارکننده‌های ACE تثبیت شده باشد.

(۶) در دوز بالا ممکن است پروتئینوری و سندرم نفروتیک روی دهد

(۷) به بیمار بگوئید احساس سبکی سر را گزارش نماید.