

کارودیلول

Carvedilol

گروه درمانی : ضد هیپرتانسیون، ضد آنژین صدری، بتابلوکر غیر
انتخابی قلبی

اشکال دارویی :

Tablets: 6.25mg, 12.5mg, 25mg

راه تجویز : Po

اندیکاسیون

(۱) هیپرتانسیون

(۲) آنژیم صدری

۳) به عنوان داروی کمکی در نارسایی قلبی

۴) اختلال کارکرد بطن چپ به دنبال MI. شروع با 6.25mg دو بار در روز که بعد از ۱۰-۳ روز در مدت تحمل به 12.5mg دو بار در روز و سپس به دوز هدف 25mg دو بار در روز افزایش داده شود.

کنتراندیکاسیون

- ۱) آسم برونشial
- ۲) برادیکاردی سینوسی
- ۳) بلوک قلبی بیشتر از درجه اول
- ۴) شوک کاردیوژنیک
- ۵) نارسایی جبران نشده قلبی کلاس IV
- ۶) اختلال کارکرد کبدی

عوارض جانبی

- ۱) خستگی

- (۲) تب
- (۳) توهم
- (۴) سبکی سر
- (۵) تضعیف شعور
- (۶) برادیکاردی
- (۷) یبوست با فرم آهسته رهش
- (۸) برونکواسپاسم

توجهات پرستاری

- (۱) به دلیل متابولیسم بالای دارو در کبد، در نارسایی کبدی مصرف آن توصیه نمی‌شود.
- (۲) یک ساعت بعد از اولین دوز و بعد از هر مرحله افزایش دوز فشار خون در حالت ایستاده اندازه‌گیری شود و مراقب وقوع گیجی یا احساس سبکی سر باشید.
- (۳) دارو همراه با غذا مصرف گردد.
- (۴) به بیمار، به ویژه سالمندان توصیه کنید طی درمان (به‌خصوص در شروع درمان) از تغییر وضعیت ناگهانی خودداری کند تا از

وقوع هیپوتانسیون ارتواستاتیک پیشگیری شود.

۵) قبل از تجویز دارو در نارسایی قلبی باید دوز ژل گلیکوزیدهای قلبی، دیورتیک‌ها و مهارکننده‌های ACE تثبیت شده باشد.