

کلونیدین هیدروکلراید

Clonidine Hydrochloride

گروه درمانی : ضد هیپرتانسیون

اشکال دارویی :

Tablets:0.2mg

راه تجویز : Po

اندیکاسیون

(۱) هیپرتانسیون

(۲) درمان کمکی در محرومیت از نیکوتین

(۳) پروفیلاکسی سردرد عروقی

۴) درمان علائم وازوموتور یائسگی

۵) کولیت اولسراتیو

۶) نورالژی

۷) سندرم Tourette

۸) اسهال دیابتی

۹) تاخیر رشد در کودکان

۱۰) برای تشخیص فتوکروموسیتوما

کنترل اندیکاسیون

۱) حساسیت مفرط به دارو

۲) در دردهای زایمانی

۳) جراحی زنان و دردهای قبل و بعد از جراحی به دلیل شانس

ایجاد عدم ثبات همودینامیک

عوارض جانبی

- (۱) آزیٹاسیون
- (۲) افسردگی
- (۳) گیجی
- (۴) خواب آلودگی
- (۵) برادیکاردی
- (۶) هیپوتانسیون ارتواستاتیک
- (۷) هیپرتانسیون ریباند شدید (شایع)
- (۸) افزایش وزن
- (۹) کاهش میل جنسی

توجهات پرستاری

- (۱) در اورژانس فشار خون می‌توان از خاصیت پایین آوردن سریع فشار خون این دارو استفاده نمود.
- (۲) قطع مصرف دارو باید تدریجی و طی ۶-۴ روز باشد تا از بروز هیپرتانسیون ریباند جلوگیری شود.

۳) در شروع درمان روزانه باید وزن بیمار اندازه‌گیری شود (برای تشخیص بروز احتباس مایع)

۴) بیمار باید افزایش وزن بیش از ۵ پوند در هفته را گزارش نماید

۵) در بیماران با نارسایی کلیوی ممکن است دوزهای کمتر، کافی باشد.

۶) به بیمار توصیه نمائید آخرین دوز را موقع خواب مصرف کند تا از کنترل فشار خون ضمن خواب اطمینان حاصل شود. به بیمار در مورد خطر قطع ناگهانی دارو توضیح دهید.