

کلوپیدوگرل

Clopidogrel

گروه درمانی : ضد پلاکت

اشکال دارویی :

Film coated Tablets: 75mg

راه تجویز : Po

اندیکاسیون

۱) کاهش انفارکتوس میوکارد و CVA در بیماران مبتلا به
آترواسکلروزیس. بالغین: 75mg از راه خوراکی، یکبار در روز
به همراه غذا و یا با معده خالی تجویز می شود.

کنتراندیکاسیون

- (۱) زخم پپتیک
- (۲) خونریزی داخل جمجمه‌ای
- (۳) حساسیت مفرط به دارو
- (۴) اختلال عملکرد کبد

عوارض جانبی

- (۱) سرگیجه
- (۲) درد قفسه سینه
- (۳) هیپرتانسیون
- (۴) گاستریت

توجهات پرستاری

- (۱) این دارو را می‌توان قبل و یا بعد از غذا تجویز کرد.

۲) این دارو بیشتر در افرادی که نسبت به آسپرین حساسیت دارند، استفاده می شود.

۳) دارو باید حداقل یک هفته قبل از انجام اعمال جراحی قطع شود.

۴) به بیمار آموزش دهید در صورت خونریزی غیر عادی به پزشک مراجعه کند.