

دالتپارین

Dalteparin sodium

گروه درمانی : ضد انعقادی، مشتق هپارین با وزن مولکولی کم

اشکال دارویی :

Injection: 7500 1u/0.3ml, 10000 1u/ml, 12500 1u/ml, 25000 1u/n

راه تجویز : SC

اندیکاسیون

- (۱) پروفیلاکسی ترومبوز ورید عمقی. قبل از جراحی شکمی در بیماران پر خطر (بیماران بالاتر از ۴۰ سال، بیهوشی عمومی بیشتر از ۳۰ دقیقه و با سابقه DVT یا آمبولی ریوی)
- (۲) پروفیلاکسی DVT در جراحی تعویض مفصل لگن

- (۳) آئزین ناپایداری یا MI، فاقد موج Q تحت آسپرین
- (۴) خطر عوامل ترومبوآمبولیک در بیماران شدیداً بی حرکت طی بیماری حاد.

کنتراندیکاسیون

- (۱) حساسیت مفرط به دارو
- (۲) حساسیت مفرط به هپارین و یا محصولات خوراکی
- (۳) خونریزی فعال و شدید
- (۴) ترومبوسیتوپنی با وجود آنتی بادی علیه پلاکت

عوارض جانبی

- (۱) تب
- (۲) خونریزی
- (۳) ترومبوسیتوپنی
- (۴) اکیموز

(۵) خارش

(۶) راش

(۷) عوارض خونریزی

توجهات پرستاری

(۱) محل تزریق زیر جلدی (دورناف، بالای ران و باسن) را دائماً تغییر دهید.

(۲) آزمایشات CBC (از جمله شمارش پلاکت) و خون مخفی مدفوع را مرتباً انجام دهید.

(۳) نیازی به پایش مرتب PT، INR یا APTT نیست.

(۴) در صورت وقوع ترومبوآمبولی علی‌رغم مصرف دارو، دارو را متوقف کنید.

(۵) به بیمار بگوئید از مصرف داروهای OTC حاوی آسپرین یا NSAIDs خودداری کند مگر با نظر پزشک

(۶) هشدار دهید در صورت بروز خونریزی یا کمبود غیر معمول سریعاً گزارش دهد.