

دiazoxide

Diazoxide

گروه درمانی : ضد هیپرتانسیون

اشکال دارویی :

Capsules: 50mg, 100mg

Injection: 300mg/20ml

راه تجویز : IV/Po

اندیکاسیون

(۱) بحران هیپرتانسیون: 1-3mg/kg وریدی (حداکثر تا 150mg)
هر 5-15 دقیقه تا کاهش فشار خون به مقدار کافی با فواصل
4-24 ساعت می‌توان دوز را تکرار کرد تا فشار خون در سطوح

قبل از درمان حفظ شود یا داروی خوراکی قابل استفاده باشد
تا ۱۰ روز مصرف نشود.

کنتراندیکاسیون

- (۱) وجود حساسیت مفرط به دارو، سایر تiazیدها یا داروهای مشتق
از سولفونامید
- (۲) درمان هیپرتانسیون جبرانی
- (۳) هیپوگلیسمی فائوکنشال

عوارض جانبی

- (۱) اضطراب
- (۲) گیجی
- (۳) بی خوابی
- (۴) آریتمی
- (۵) هیپوتانسیون

۶) احتباس مایع و سدیم

۷) اسهال

۸) هماچوری

۹) کاهش برون ده ادراری

۱۰) هیپرگلیسمی

توجهات پرستاری

۱) بندرت ۴ تا ۵ روز به درمان وریدی نیاز می شود، درمان وریدی هر چه سریعتر به درمان خوراکی تبدیل شود.

۲) بعد از تزریق وریدی هر ۵ دقیقه تا مدت ۳۰-۱۵ دقیقه و سپس هر یک ساعت فشار خون را پایش کنید.

۳) در صورت احتباس آب و مایع، می توان ۳۰ تا ۶۰ دقیقه بعد از دیازوکساید داروی دیورتیک تجویز کرد و به مدت ۱۰-۸ ساعت بعد از تجویز دیورتیک بیمار به حالت درازکش باشد.

۴) به بیمار توصیه کنید از بلند شدن ناگهانی پرهیز کند.

۵) به بیمار بگوئید واکنش های ناخواسته به ویژه درد و قرمزی در محل تزریق را سریعاً گزارش کند.

۶) افزایش وزن بیش از 2-3kg در هفته را گزارش کند.

۷) به بیمار اطمینان دهید که رشد بیش از حد موها واکنش شایع است و با تکمیل درمان برطرف می شود.