

# دیگوکسین

## Digoxin

گروه درمانی : گلیکوزید قلبی

اشکال دارویی :

Tablets:0.25mg

Oral Drops:0.5mg/ml

Injection:0.5mg/2ml

Elixir:5mg/ml

راه تجویز : IM/Slow IV/IV/Po

اندیکاسیون

(۱) نارسایی قلبی

(۲) فلوتر دهلیزی

۳) فیبریلاسیون دهلیزی، تکیکاردی پاروکسیسمال دهلیزی (PAT)

## کنتراندیکاسیون

۱) حساسیت مفرط به دارو و یا در کسانی که دچار مسمومیت با دارو شده‌اند

۲) فیبریلاسیون بطنی

۳) تکیکاردی بطنی ناشی از نارسایی قلبی

## عوارض جانبی

۱) آریتمیسیون

۲) خستگی

۳) ضعف عمومی عضلات

۴) سردرد

۵) سرگیجه

(۶) آریتمی

(۷) فوتوفوبی

(۸) درد شکم

## توجهات پرستاری

(۱) ۶ ساعت بعد از دوز دیژیتالیزه در کودکان، EKG به عمل آورید و بروز سمیت را ارزیابی کنید.

(۲) سرعت ضربان قلب ۶۰ ضربان در دقیقه یا کمتر می‌تواند نشانه‌ای از مسمومیت با دیگوکسین باشد لذا بلافاصله مصرف دارو را متوقف و سطح سرمی را چک کنید.

(۳) تغییرات EKG می‌تواند به صورت افزایش فاصله PR و پایین آمدن قطع ST باشد.

(۴) در تست ورزش دارو می‌تواند موجب تغییرات کاذب مثبت ST-T در EKG شود.

(۵) قبل از تجویز دوز بارگیری در مورد مصرف گلیکوزیدهای قلبی طی ۲-۳ هفته گذشته از بیمار سوال کنید، همیشه دوز بارگیری را طی ۲۴ ساعت اول تقسیم کنید مگر این که وضعیت بالینی روش دیگری را ایجاب کند.