

دیلتiazem

Diltiazem

گروه درمانی : ضد آنژین، ضد هیپرتانسیون، ضد آریتمی

اشکال دارویی :

Injection:100mg(powder)

Tablets:60mg

Tablets:120mg

Capsules:120mg

راه تجویز : IV/Po

اندیکاسیون

(۱) درمان آنژین پریزنیتال یا واریانت صدری پایدار

(۲) هیپرتانسیون

(۳) فیبریلاسیون یا فلوتردهلیزی

(۴) تاقیکاردی فوق بطنی حمله‌ای

کنتراندیکاسیون

(۱) سندرم سینوس بیمار یا بلوک درجه دو یا سه بدون وجود
پس میکرومصلوبی

(۲) ابتلا به هیپوتانسیون (فشار سیستمیک کمتر از 90mmHg)

(۳) حساسیت مفرط به دارو

(۴) MI حاد

(۵) احتقان ریوی

عوارض جانبی

(۱) ضعف

(۲) اختلالات راه رفتن

- (۳) سردرد
- (۴) بی خوابی
- (۵) خواب آلودگی
- (۶) آریتمی
- (۷) بلوک AV
- (۸) برادیکاردی
- (۹) اختلالات هدایتی

توجهات پرستاری

- (۱) در آنژین حاد می توان در صورت نیاز از نیتروگلیسرین زیر زبانی استفاده کرد.
- (۲) دیلتیازم را می توان در محلول D5w یا N/S رقیق کرد.
- (۳) دارو با فورسماید وریدی ناسازگار است.
- (۴) در صورت فشار خون سیستولیک کمتر از 90mmHg و یا سرعت ضربان قلب کمتر از 60 ضربه در دقیقه مصرف دارو قطع گردد.

(۵) قرص‌های آهسته رهش نباید شکسته یا جویده شوند

(۶) به بیمار بگوئید که درمان نیترات طی دوره تنظیم دوز دیلتیازم می‌تواند سبب گیجی شود. به بیمار توصیه کنید تا عارضه را تحمل و درمان را ادامه دهد.