

دیپیریدامول

Dipyridamol

گروه درمانی : گشاد کننده عروق کرونر، مهار کننده تجمع پلاکت

اشکال دارویی :

Tablets: 25mg, 75mg

Injection: 10mg/2ml

راه تجویز : IV/Po

اندیکاسیون

(۱) آلترناتیو به ورزش در تصویر برداری پرفیوژن میوکارد با تالیوم

(۲) مهار چسبندگی پلاکت در بیماران با دریچه مصنوعی قلب
همراه با وارفارین و آسپرین

۳) پیشگیری از عوارض ترومبوآمبولی

کنتراندیکاسیون

۱) منع مصرف شناخته شده‌ای ندارد.

عوارض جانبی

۱) گیجی

۲) سردرد

۳) درد قفسه سینه

۴) هیپرتانسیون

۵) غش

۶) برافروختگی

۷) تهوع و استفراغ

۸) خارش

۹) راش و تحریک پوستی

توجهات پرستاری

- (۱) دارو حداقل یک ساعت قبل از غذا مصرف گردد.
- (۲) فرآورده‌های وریدی را حداقل به نسبت یک به دو با محلول سالین یا محلول دکستروز 5% تا حجم کل 20-50ml رقیق کنید.
- (۳) به بیمار گوشزد کنید که بروز پاسخ بالینی ممکن است ۲-۳ ماه به طول انجامد
- (۴) به بیمار توصیه کنید از مصرف داروهای حاوی آسپرین یا NSAIDs بدون نظر پزشک معالج خودداری کند.