

دیزوپیرامید فسفات

Disopyramide phosphate

گروه درمانی : ضد آریتمی بطنی، ضد آریتمی فوق بطنی، ضد
تاکیکاردی

اشکال دارویی :

Capsules:100mg

راه تجویز : Po

اندیکاسیون

(۱) PVCs (یک کانونی و چند کانونی یا جفت)

(۲) تاکیکاردی بطنی

- (۳) برگردان فیبریلاسیون دهلیزی، فلوتر دهلیزی
- (۴) برگرداندن تاقیکاردی حمله‌ای دهلیزی به ریتم نرمال
سینوسی. بالغین: در ابتدا، 200-300mg دوز بارگیری، سپس
دوز نگهدارنده 150mg خوراکی هر ۶ ساعت
- (۵)

کنتراندیکاسیون

- (۱) حساسیت مفرط به دارو
- (۲) شوک کاردیوژنیک
- (۳) بلوک قلبی درجه دو یا سه بدون وجود پیس‌میکرمصنوعی
- (۴) QT طولانی مادرزادی
- (۵) سندرم سینوس بیمار

عوارض جانبی

- (۱) آرتیتاسیون

(۲) افسردگی

(۳) گیجی

(۴) آریتمی

(۵) درد قفسه سینه

(۶) ناتوانی جنسی

(۷) احتباس ادراری

(۸) هیپوکالمی

(۹) هیپرگلیسمی

توجهات پرستاری

(۱) برای جلوگیری از خشکی دهان از آدامس یا آبنبات فاقد قند استفاده کند

(۲) در صورت بروز یبوست با تجویز مسهل ها و تغذیه پرفیبر آن را اصلاح کند

(۳) بیماران فلوتر یا فیبریلاسیون دهلیزی باید قبلاً دیرتالیزه شوند تا از بروز تاکیکاردی بطنی بعد از تجویز دارو جلوگیری شود

۴) اختلالات الکترولیت به ویژه هیپوکالمی می‌تواند این دارو را بی‌اثر کند، لذا قبلاً باید اصلاح شود

۵) چون این دارو با همودیالیز برداشته می‌شود لذا ممکن است بعد از هر جلسه دیالیز نیاز به تنظیم دوز شود