

آنالاپریل

Enalapril ® vasotec

گروه درمانی : ضد هیپرتانسیون

اشکال دارویی :

Tablets: 5mg, 20mg

راه تجویز : Po

اندیکاسیون

(۱) هیپرتانسیون

(۲) نارسایی قلبی

۳) اختلال کارکرد بدون علامت بطن چپ اگر بیمار داروی دیورتیکی مصرف نمی‌کند، شروع با 5mg خوراکی در روز که با توجه به پاسخ درمانی تنظیم می‌شود. دوز معمول درمانی 10-40mg در روز به صورت دوز واحد یا منقسم در دو دوز است. در صورت استفاده از دیورتیک، دوز شروع 2.5mg خوراکی یکبار در روز است.

کنتراندیکاسیون

- ۱) حساسیت مفرط به دارو
- ۲) سابقه آنژیوادم ناشی از مهارکننده‌های ACE
- ۳) بیماران در معرض خطر شوک کاردیوژنیک

عوارض جانبی

- ۱) سستی
- ۲) خستگی
- ۳) سردرد

(۴) برادیکاردی

(۵) درد قفسه سینه

(۶) هیپوتانسیون

(۷) تنگی نفس

(۸) راش

توجهات پرستاری

(۱) طی درمان پروتئینوری و سندرم نفروتیک ممکن است بروز کند.

(۲) دوالی سه روز قبل از شروع آنالاپریل دیورتیک را متوقف کنید تا خطر بروز هیپوتانسیون کاهش یابد، اگر آنالاپریل نتوانست در حد کافی فشار خون را کنترل کند، دیورتیک را مجدداً شروع کنید.

(۳) به بیمار بگوئید به ویژه در چند روز اول سبکی سر را گزارش کند تا در صورت لزوم دوز تنظیم شود.

(۴) به علت احتمال بروز هیپوتانسیون ارتواستاتیک از تغییر وضعیت ناگهانی پرهیز نماید.