

آنوکسپارین

Enoxaparin sodium

گروه درمانی : ضد انعقاد، هپارین با وزن مولکولی کم

اشکال دارویی :

Injection: 100mg/ml (0.2ml, 0.4ml, 0.6ml, 0.8ml, 1ml)

راه تجویز : SC

اندیکاسیون

(۱) پیشگیری از ترومبوز ورید عمقی (DVT) بعد از جراحی

تعویض لگن یا زانو

(۲) پیشگیری از DVT بعد از جراحی شکم

۳) پیشگیری از عوارض ایسکمیک آنژین ناپایدار و MI بدون موج Q، به همراه آسپرین

۴) درمان DVT حاد با یا بدون آمبولی ریوی به همراه وارفارین
سدیم در بیمار بستری

۵) درمان DVT بدون آمبولی ریوی

کنترل اندیکاسیون

۱) حساسیت مفرط به دارو و هپارین و یا محصولات خوراکی

۲) ابتلا به خونریزی فعال و عمده یا ترومبوسیتوپنی

۳) بیماران که در حضور دارو آنتی بادیه‌ای ضد پلاکت دارند

عوارض جانبی

۱) کنفوزیون

۲) تب

۳) درد قفسه سینه

(۴) هماتوم

(۵) خونریزی

(۶) ترومبوسیتوینی

(۷) اکیموز

(۸) راش و کهیر

توجهات پرستاری

(۱) طی دوره درمان نمی‌توان این دارو را با سایر ترکیبات هپارین تعویض کرد.

(۲) قبل از شروع درمان بیمار را از جهت وجود عارضه خونریزی دهنده مثل زخم گوارشی بررسی کنید.

(۳) این دارو قابل تزریق به صورت عضلانی نیست.

(۴) از ماساژ محل تزریق پرهیزید

(۵) قبل از تزریق حباب هوا را از سرنگ خارج نکنید تا تمام داروی موجود در سرنگ تزریق شود.