

اتا کرینیک اسید

Ethacrynic Acid

گروه درمانی : دیورتیک

اشکال دارویی :

Tablets:50mg

راه تجویز : Po

اندیکاسیون

- (۱) ادم به علت اختلال کبدی یا کلیوی یا نارسایی قلبی.
بالغین: روزانه 50-200mg از راه خوراکی مصرف می شود.
- (۲) هیپرتانسیون. بالغین: در شروع روزانه 25mg از راه خوراکی.

کنترال اندیکاسیون

- (۱) حساسیت مفرط
- (۲) آنوری
- (۳) هیپوتانسیون
- (۴) دهیدراتاسیون همراه با هیپوناترمی

عوارض جانبی

- (۱) کاهش حجم و دهیدراتاسیون
- (۲) هیپوتانسیون ارتواستاتیک
- (۳) درد شکمی
- (۴) اگرانولوسیتوز

توجهات پرستاری

- ۱) به منظور پیشگیری از تحریک گوارشی ناشی از دارو؛
اتاکرینیک اسید را بعد از غذا تجویز نمائید.
- ۲) به منظور جلوگیری از ناکچوری در صورت امکان دارو را
حداقل چهار ساعت قبل از خواب تجویز نمائید.
- ۳) فشار خون بیمار را در خلال مراحل اولیه شروع درمان به طور
مرتب کنترل نمائید.
- ۴) میزان I/O را کنترل نمائید.
- ۵) بیمار را از نظر بروز علایم ترومبوآمبولی و اختلالات الکترولیتی
تحت نظر بگیرید.