

فورزمايد

Furosmide ® lasix

گروه درمانی : دیورتیک، آنتی هیپرتانسیو

اشکال دارویی :

Injection: 20mg/2ml, 40mg/4ml, 250mg/25ml

Tablets: 40mg

راه تجویز : IM/IV/Po

اندیکاسیون

۱) ادم حاد ریوی. بالغین: 40mg تزریق آهسته وریدی (طی
۱-۲ دقیقه)، سپس در صورت نیاز 80mg وریدی طی یک
ساعت

(۲) آدم

(۳) هیپرتانسیون

(۴) هیپرکلسمی

کنتراندیکاسیون

(۱) حساسیت مفرط به دارو

(۲) آنوری

(۳) کومای کبدی

(۴) کمبود شدید الکترولیت‌ها

(۵) بروز یا افزایش ازتمی

(۶) اولیگوری

عوارض جانبی

(۱) گیجی

(۲) تب

- ۳) سردرد
- ۴) بی‌قراری
- ۵) کاهش حجم و دهیدراتاسیون
- ۶) هیپوتانسیون ارتواستاتیک
- ۷) اولیگوری
- ۸) پلی‌اوری
- ۹) هیپوکالمی

توجهات پرستاری

- ۱) جهت انفوزیون وریدی، دارو را می‌توانید در محلول‌های مختلف رقیق کنید، سرعت انفوزیون نباید بیشتر از 4mg در دقیقه باشد.
- ۲) قبل از درمان و طی آن سطح پتاسیم و CBC را چک کنید.
- ۳) در مورد احتمال بروز واکنش حساسیت به نور به بیمار توضیح دهید.