

هپارین سدیم

Heparin sodium

گروه درمانی : ضد انعقاد

اشکال دارویی :

Injection: 5000,10000 u/ml

راه تجویز : IV/SC

اندیکاسیون

(۱) پروفیلاکسی آمبولی، بعد از MI: 5000u زیر جلدی هر ۱۲-۸ ساعت

(۲) باز نگهداشتن کاتتر ثابت IV: 10-100u به صورت IV push

۳) آنژین صدری ناپایدار

۴) آمبولی ریوی

۵) جراحی قلب باز: 15-400u/kg انفوزیون وریدی پیوسته

کنتراندیکاسیون

۱) دیس کرازی های خونی

۲) زخم باز

۳) خونریزی فعال

۴) حساسیت مفرط

۵) ترومبوسیتوپنی شدید

۶) احتمال خونریزی مغزی

۷) هموفیلی

توجهات پرستاری

۱) قبل از درمان و در طی درمان CBC/PLT و تست‌های انعقادی انجام شود.

۲) دارو در ساعت مشخص (جهت ثابت نگه داشتن سطح خونی تزریق شود)

۳) در تزریق زیر جلدی ناحیه را ماساژ نداده و آسپیره نکنید.

۴) بیمار از لحاظ خونریزی لثه، بینی، هماغوری، ملنا، استفراغ خونی بررسی شود.

۵) در هنگام تجویز این دارو باید، پروتامین سولفات در دسترس باشد

۶) بهتر است هیچ تزریق عضلانی انجام نشود.