

هیدرالازین هیدروکلراید

Hydralazine Hydrochloride

گروه درمانی : ضد هیپرتانسیون

اشکال دارویی :

Injection:20mg

Tablets:10mg, 25mg, 50mg

راه تجویز : IM/IV/Po

اندیکاسیون

(۱) هیپرتانسیون متوسط تا شدید

(۲) نارسایی قلبی شدید

کنتراندیکاسیون

- ۱) حساسیت مفرط به دارو و سایر آلکالوئیدهای بلادونا نظیر آتروپین
- ۲) ابتلا به گلوکوم
- ۳) چسبندگی بین قرنیه و عدسی

عوارض جانبی

- ۱) کنفوزیون
- ۲) سردرد
- ۳) خواب آلودگی
- ۴) تاکیکاردی
- ۵) تاری دید
- ۶) خشکی دهان
- ۷) راش

توجهات پرستاری

- ۱) بیمار را به مصرف بیشتر مایعات تشویق کنید.
- ۲) به بیمار اطمینان دهید که آلکوپسی موقت خواهد بود.
- ۳) به بیمار و اطرافیان او اطلاع دهید از واکسیناسیون با ویروس زنده خودداری نمایند.
- ۴) در صورت تداوم سمیت عصبی (که برگشت پذیر است) علی‌رغم کاهش دوز، مصرف دارو متوقف شود.