

هیدروکلروتیازید

Hydrochlorothiazide

گروه درمانی : دیورتیک، ضد هیپرتانسیون

اشکال دارویی :

Tablets:50mg

راه تجویز : Po

اندیکاسیون

(۱) ادم

(۲) هیپرتانسیون. بالغین: 12.5-50mg خوراکی یک بار در روز.
براساس فشار خون دوز را تنظیم کنید. دوزهای بیشتر از 25mg
اغلب اثر بیشتری ندارد.

کنتراندیکاسیون

- (۱) ابتلا به آنوری
- (۲) کومای کبدی
- (۳) حساسیت مفرط به سایر تiazیدها یا سایر مشتقات سولفانامید

عوارض جانبی

- (۱) گیجی
- (۲) سردرد
- (۳) بی‌قراری
- (۴) میوکاردیت آلرژیک
- (۵) هیپوتانسیون
- (۶) هیپوتانسیون ارتواستاتیک
- (۷) آنمی همولیتیک

توجهات پرستاری

(۱) به بیمار توصیه کنید برای کاهش تحریک گوارش دارو را با غذا و ترجیحاً موقع صبح یا اوایل عصر مصرف کند تا از بروز ناکچوری جلوگیری شود و از تغییر ناگهانی وضعیت نیز پرهیز کند.

(۲) به دلیل بروز واکنش‌های حساسیت مفرط بهتر است. به بیمار بگویید قبل از مصرف داروهای OTC با پزشک مشورت کند.