

# لیدوکائین هیدروکلراید

## Lidocaine Hydrochloride

گروه درمانی : ضد آریتمی بطنی

اشکال دارویی :

Cartidge 2%

For Injection: 20%, 50%

Inj (20cc): 1%, 2%

Inj (5cc): 1%, 2%

Inj (10cc): 1%, 2%

راه تجویز : Local/IV/IM/SC

اندیکاسیون

۱) آریتمی‌های بطنی ناشی از MI، دستکاری‌های قلبی یا  
گلیکوزیدهای قلبی. بالغین: 50-100mg دوز بولوس به صورت

وریدی با سرعت 25-50mg در دقیقه تزریق شود. در صورت  
عدم پاسخ، دوز را بعد از ۵ دقیقه تکرار کنید.

(۲) صرع پایدار

(۳) بی‌حسی موضعی پوست و مخاط

## کنتراندیکاسیون

(۱) حساسیت مفرط به بی‌حس کننده‌های موضعی آمیدی

(۲) سندرم استوکس - آدامز

(۳) سندرم ولف - پارکینسون - وایت

(۴) درجات شدید بلوک SA، AV یا داخل بطنی بدون حضور پيس  
میکر

## عوارض جانبی

(۱) اضطراب

(۲) کنفوزیون

- (۳) لنارژی
- (۴) بی‌قراری
- (۵) تشنج
- (۶) خواب‌آلودگی
- (۷) آسیستول
- (۸) برادیکاردی
- (۹) ایست قلبی

## توجهات پرستاری

- (۱) تزریق عضلانی سطح CK را تا هفت برابر افزایش می‌دهد.
- (۲) در بیمار تحت درمان بالیدوکائین باید اکسیژن و تجهیزات احیاء در دسترس باشد
- (۳) در تمام مدت انفوزیون مونیتورینگ قلبی ضروری است. انفوزیون باید توسط پمپ انفوزیون یا میکروست صورت گیرد و سرعت آن نباید از 4mg در دقیقه بیشتر باشد.
- (۴) به بیمار توصیه کنید آهسته شدن یا غیرطبیعی شدن ضربان قلب، زنگ زدن در گوش‌ها، تغییرات بینایی، اشکال در نفس

کشیدن و کنفوزیون را سریعاً گزارش نماید.