

منیزیم هیدروکساید

Magnesium Hydroxide ®
MOM

گروه درمانی : آنتی اسید – ملین

اشکال دارویی :

Suspension: 8% (120, 240ml)

راه تجویز : Po

اندیکاسیون

(۱) آنتی اسید. بالغین: 5-15ml از راه خوراکی، چهار بار در روز
همراه با آب مصرف می شود.

(۲) ملین. بالغین: 30-60ml از راه خوراکی، به صورت دوز واحد همراه با آب یا سایر مایعات تجویز می‌شود.

کنتراندیکاسیون

- (۱) بلوک قلبی
- (۲) آنوری
- (۳) هیپوکلسمی و هیپومنیزیمی
- (۴) اختلال عملکرد کلیه

عوارض جانبی

- (۱) خواب آلودگی
- (۲) برادیکاردی
- (۳) آریتمی
- (۴) هیپوتانسیون
- (۵) اسهال

توجهات پرستاری

- (۱) در صورتی که دارو را به عنوان آنتی اسید تجویز نموده‌اید، بهتر است دارو را ۶۰-۳۰ دقیقه قبل از غذا و هنگام خواب تجویز نمود. دارو را باید با مقداری آب مصرف کرد. در صورت تجویز دارو به عنوان ملین، حتماً بعد از مصرف دارو باید حداقل یک لیوان آب مصرف نمود.
- (۲) دارو را صبح‌ها و هنگام خواب تجویز نمائید.
- (۳) این دارو را حداقل با فاصله ۲ ساعت از سایر داروها مصرف نمائید.
- (۴) این دارو باید به مدت کوتاه مصرف گردد، چون مصرف طولی‌المدت این دارو باعث برهم خوردن تعادل الکترولیتی و وابستگی دارویی خواهد شد.