

متیل دوپا

Methyldopa ® Aldomet

گروه درمانی : ضد هیپرتانسیون

اشکال دارویی :

Tablets: 250mg

راه تجویز : Po

اندیکاسیون

۱) هیپرتانسیون متوسط تا شدید. بالغین: شروع با 250mg خوراکی دو یا سه بار در ۴۸ ساعت اول سپس در صورت لزوم هر ۲ روز دوز کاهش یا افزایش داده می شود.

کنتراندیکاسیون

- (۱) حساسیت مفرط به دارو
- (۲) ابتلا به بیماری فعال کبدی
- (۳) مصرف همزمان با مهارکننده‌های MAO
- (۴) سابقه بیماری کبدی

عوارض جانبی

- (۱) دپرسیون
- (۲) گیجی
- (۳) سردرد
- (۴) کابوس شبانه
- (۵) تشدید آنژین
- (۶) برادیکاردی
- (۷) هیپوتانسیون ارتواستاتیک
- (۸) یبوست

۹) ناتوانی جنسی

۱۰) آنمی همولیتیک

توجهات پرستاری

۱) تب دارویی اغلب طی ۳ ماه اول شروع درمان بروز می‌کند و ممکن است با ائوزینوفیلی و تغییر در آزمایشات کارکرد کبدی همراه باشد.

۲) تسکین و خواب‌آلودگی اغلب با ادامه درمان برطرف می‌شود. بروز هیپوتانسیون ارتواستاتیک ممکن است نیاز به کاهش دوز را موجب گردد.

۳) بعد از ۳-۲ ماه از درمان ممکن است تحمل بروز کند

۴) نشانه‌های سمیت کبدی می‌تواند ۴-۲ هفته بعد از شروع درمان بروز کند.

۵) واکنش‌های ناخواسته نظیر حرکات پرشی، افزایش وزن بیش از ۵ پوند در هفته و نشانه‌های عفونت و تب را توضیح داده و بر نیاز به گزارش آن‌ها تاکید کند.