

متوپرولول تارترات

Metoprolol Tartrate

گروه درمانی : ضد هیپرتانسیون، درمان کمکی در MI حاد
اشکال دارویی :

Tablets: 50mg, 100mg
Injection: 5mg/5ml

راه تجویز : IV/Po

اندیکاسیون

- (۱) هیپرتانسیون خفیف تا شدید
- (۲) مداخله زودرس در MI حاد
- (۳) مداخله دیررس در MI حاد

(۴) فیبریلاسیون دهلیزی به دنبال MI حاد

(۵) آنژین

کنتراندیکاسیون

(۱) حساسیت مفرط به دارو و یا سایر بتابلوکرها

(۲) برادیکاردی سینوسی

(۳) شوک کاردیوژنیک

(۴) فشار سیستولیک کمتر از 100mmHg

(۵) نارسایی قلبی متوسط تا شدید

(۶) MI با سرعت ضربان قلب کمتر از ۴۵ در دقیقه

(۷) بلوک قلبی درجه ۲ و ۳

عوارض جانبی

(۱) افسردگی

(۲) سردرد

- ۳) آریتمی
- ۴) برادیکاردی
- ۵) هیپوتانسیون
- ۶) اسهال
- ۷) برونکواسپاسم
- ۸) راش
- ۹) کاهش لیپیدو

توجهات پرستاری

- ۱) از مصرف شبانه دارو خودداری شود تا بی خوابی به حداقل برسد.
- ۲) در دوره تنظیم دوز، فشار خون را به طور مرتب و در درمان نگهدارنده هر ۶-۳ ماه چک کنید.
- ۳) برای فیبریلاسیون دهلیزی به دنبال MI حاد، صرفاً در بیمارانی که فاقد بلوک AV و اختلال کارکرد بطن چپ باشد، مصرف شود.

۴) توقف مصرف دارو باید تدریجی و طی ۳-۱ دقیقه صورت گیرد.

۵) به بیماران دیابتی هشدار دهید که دارو می‌تواند علائم هیپوگلیسمی را مخفی نگه‌دارد.