

مورفین سولفات

Morphine Sulfate

گروه درمانی : ضد درد مخدر

اشکال دارویی :

Injection: 10mg/ml

Tablets:10mg

راه تجویز : Slow IV/SC/IM/Po

اندیکاسیون

(۱) درد شدید. 10mg هر ۴ ساعت تزریق زیر جلدی یا عضلانی
یا خوراکی

(۲) درد شدید مزمن مرتبط با سرطان

(۳) کنترل درد ناشی از MI حاد

(۴) درمان کمکی در ادم حاد ریوی

کنترل اندیکاسیون

(۱) تزریق وریدی در آسم برونکیال

(۲) انسداد مجاری هوایی فوقانی

(۳) سالمندان

(۴) بیماران دچار ضربه سر

عوارض جانبی

(۱) اغتشاش شعور

(۲) دپرسیون تنفسی

(۳) گیجی و منگی

(۴) اسپاسم مجاری صفراوی

(۵) ایست تنفسی

٦) تضعیف تنفسی

توجهات پرستاری

- ١) مورفین داروی انتخابی برای کاهش درد ناشی از MI است و می‌تواند موقتاً موجب افت فشار خون شود.
- ٢) دردهای شدید مزمن، دارو را به صورت برنامه ریزی شده سر ساعت تجویز کنید.
- ٣) جهت کاهش تحریک گوارشی دارو با غذا میل گردد.