

نالوکسان

Naloxone Hcl

گروه درمانی : آنتاگونیست نارکوتیک (اپیوئید)

اشکال دارویی :

Injection: 0.4mg/ml

راه تجویز : SC/IV/IM

اندیکاسیون

۱) مسمومیت با مواد مخدر – دپرسیون تنفسی ناشی از مصرف نارکوتیک: 0.4mg تکرار هر 2-3min، اگر بعد از تجویز 10mg پاسخ نداد تشخیص سمیت فارکوتیک زیر سوال می رود رقیق کردن بیشتر از N/S و D5w به شکل انفوزیون می باشد.

کنتراندیکاسیون

- (۱) حساسیت مفرط
- (۲) دیس ریتمی های فوق بطنی
- (۳) تروما به سر و افزایش اینتراتکال
- (۴) سابقه تشنج

عوارض جانبی

- (۱) تاکی کاردی
- (۲) افزایش فشار خون
- (۳) تهوع و استفراغ در دوزهای بالا
- (۴) ادم ریوی (بعد از اعمال جراحی)
- (۵) ترمور
- (۶) تمریق

توجهات پرستاری

- (۱) دارو را به صورت عمیق عضلانی تجویز نمائید.
- (۲) بهتر است درمان به صورت متناوب (۴ ماه درمان و سپس ۶-۸ هفته استراحت) صورت گیرد.
- (۳) آزمایشات بررسی عملکرد کبد و سطح الکترولیت‌های سرم (به خصوص کلسیم و پتاسیم) را به طور متناوب به عمل آورید و بیمار را از نظر بروز مسمومیت کبدی، هیپرکالمی و هیپرکلسمی تحت نظر بگیرید.
- (۴) مصرف این دارو ممکن است منجر به از کنترل خارج شدن بیمار دیابتی شود.