

نیفیدیپین

Nifedipine ® Adalat

گروه درمانی : ضد آنژین

اشکال دارویی :

Capsules: 10mg

Capsules (extended - release): 30mg

Tablets: 10mg

Tablets (extended - release): 30mg

راه تجویز : SL/Po

اندیکاسیون

۱) درمان آنژین پریزنیتال (variant) یا آنژین پایدار مزمن: دوز

شروع 10mg خوراکی سه بار در روز است. دوز موثر معمولی

10-20mg سه بار در روز است.

(۲) هیپرتانسیون. بالغین: شروع با 30-60mg خوراکی، یک بار در روز

کنتراندیکاسیون

(۱) حساسیت مفرط به دارو

(۲) مصرف در سالمندان با احتیاط

عوارض جانبی

(۱) گیجی

(۲) تب

(۳) سردرد

(۴) حالت عصبی

(۵) گرگرفتگی

(۶) نارسایی قلبی

(۷) هیپوتانسیون

(۸) تپش قلب

(۹) یبوست

(۱۰) هیپوکالمی

توجهات پرستاری

- (۱) با شروع و یا افزایش دارو ممکن است آنژین اندکی بدتر شود، به بیمار توضیح دهید که این اثر موقت است.
- (۲) برای مصرف زیر زبانی یا داخل دهان دارو فایده‌ای ثابت نشده است.
- (۳) فشار خون را مرتب پایش کنید به ویژه اگر بیمار داروی بتابلوکر یا ضد هیپرتانسیون دیگری مصرف می‌کند.
- (۴) هر چند اثرات ریباند با توقف مصرف دارو مشاهده نشده است ولی دوز را تدریجاً کاهش دهید.
- (۵) به بیمار توضیح دهید از شکستن کپسول‌ها خودداری کند.