

اگزازپام

Oxazepam ® Serax

گروه درمانی : ضد اضطراب، آرامبخش، خواب آور

اشکال دارویی :

Tablets:10mg

راه تجویز : Po

اندیکاسیون

(۱) اضطراب. بالغین: 10-30mg از راه خوراکی، سه یا چهار بار در روز

(۲) اضطراب خفیف تا متوسط (Tension). بالغین: 10-15mg از راه خوراکی، سه یا چهار بار در روز تجویز می شود.

کنترالندیکاسیون

- (۱) حساسیت مفرط
- (۲) گلوکوم حاد زوایه باریک
- (۳) کوما
- (۴) مسمومیت حاد با الکل

عوارض جانبی

- (۱) سرگیجه
- (۲) سردرد
- (۳) یبوست
- (۴) آتاکسی
- (۵) تهوع و استفراغ
- (۶) سوء هاضمه

توجهات پرستاری

- (۱) دارو را می‌توان قبل و یا بعد از غذا تجویز نمود.
- (۲) از بیمار بخواهید تا مشخص نشدن اثر دارو از رانندگی و سایر امور نیازمند هوشیاری پرهیز نماید.
- (۳) از بیمار بخواهید جهت پیشگیری از بروز هیپوتانسیون وضعیتی، از تغییر وضعیت ناگهانی پرهیز نماید.