

پتیدین هیدروکلراید

Pethidine Hydrochloride

گروه درمانی : ضد درد مخدر

اشکال دارویی :

Injection: 50mg/ml (1ml, 2ml)

راه تجویز : Slow IV/IV Infusion/SC/IM

اندیکاسیون

۱) دردهای متوسط تا شدید: 50-150mg عضلانی زیر جلدی هر ۳-۴ ساعت

۲) داروی کمکی در بیهوشی پیش از شروع جراحی

کنتراندیکاسیون

- (۱) حمله حاد آسم
- (۲) بیماری‌های تنفسی
- (۳) بیماری التهابی روده
- (۴) دردهای شدید مداوم
- (۵) MI
- (۶) آریتمی‌های قلبی

عوارض جانبی

- (۱) تسکین مفرط
- (۲) سرخوشی
- (۳) بی‌قراری
- (۴) ترمور
- (۵) تشنج
- (۶) کنفوزیون

(۷) توهم

توجهات پرستاری

- (۱) احتمال وابستگی فیزیکی و روانی به دارو وجود دارد.
- (۲) تزریق زیر جلدی دارو دردناک است.
- (۳) طی تجویز علایم حیاتی و وضعیت همودینامیک را پایش کنید.
- (۴) در صورت مصرف بیش از حد و بروز عوارض به ویژه دپرسیون تنفی - قلبی - عروقی و CNS، اقدامات لازم همانند سایر مخدرها انجام شود.