

فنی توئین

Phenytoin ® Dilantin

گروه درمانی : ضد صرع - آنتی آریتمی

اشکال دارویی :

Susp:30mg/5ml

Topical cream:1%

Capsules:100mg,50mg

Injection:250mg/5ml

راه تجویز : IV Slow/IV Infusion/IM

اندیکاسیون

(۱) دیس ریتمی های بطنی که به درمان بالیدوکائین و پروکائین آمید پاسخ نداده اند.

۲) دیس‌ریتمی‌های ناشی از گلیکوزیدهای قلبی. بالغین: دوز اولیه، 1gr از راه خوراکی در دوزهای منقسم در خلال ۲۴ ساعت اول، سپس روزانه 500mg از راه خوراکی یا 250mg از راه وریدی در خلال ۵ دقیقه تا زمانی که دیس‌ریتمی از بین برود. سرعت تزریق نباید بیشتر از 50mg در دقیقه باشد.
(Slow IV push)

کنتراندیکاسیون

- ۱) حساسیت مفرط
- ۲) برادیکاردی سینوسی (تزریق وریدی فنی‌توئین)
- ۳) بلوک سینوسی - دهلیزی یا دهلیزی - بطنی
- ۴) سندرم Stoke-Adams

عوارض جانبی

- ۱) آتاکسی
- ۲) لکنت زبان

(۳) هیپوتانسیون

(۴) فبیریلایون بطنی

(۵) استفراغ

(۶) هیپرپلازی لثه

(۷) سندرم استیون جانسون

توجهات پرستاری

(۱) از تزریق IM فنی توثین به دلیل جذب متغیر آن و درد و آسیب بافتی که در محل ایجاد می شود تا حد امکان پرهیزید.

(۲) انفوزیون وریدی توصیه نمی شود. به طور مستقیم و آهسته و از طریق سوزنی بزرگتر و یا کنتروریدی تزریق نمائید.

(۳) تا شفاف شدن محلول ویال را تکان دهید، گاهی ۱۰ دقیقه طول می کشد. برای تسریع کار می توانید ویال را در آب گرم، گرم نمائید. تا یک ساعت بعد از تزریق علائم حیاتی را کنترل نمائید.