

# پروکائین آمید هیدروکلراید

## Procainamide Hydrochloride

گروه درمانی : ضد آریتمی بطنی، ضد آریتمی فوق بطنی

اشکال دارویی :

Capsules: 500mg

Injection: 1000mg/10ml

راه تجویز : IV Infusion/IM/Po

اندیکاسیون

(۱) PVC علامتدار، تاکیکاردی بطنی مخاطره آمیز

(۲) نگهدارنده ریتم سینوسی طبیعی بعد از برگرداندن فلوتر دهلیزی

(۳) دوز بارگیری برای جلوگیری از فیبریلاسیون دهلیزی یا  
تاکیکاردی حمله‌ای دهلیزی

(۴) هیپرترمی بدخیم

## کنترل اندیکاسیون

(۱) حساسیت مفرط به دارو

(۲) بلوک قلبی کامل یا درجه دو یا سه بدون وجود پیس‌میکر  
مصنوعی

(۳) مبتلا به میاستنی گراویس یا SLE

(۴) تاکیکاردی بطنی غیر تیپیک (Torsades de pointes)

## عوارض جانبی

(۱) کنفوزیون

(۲) افسردگی

(۳) توهم

- (۴) برادیکاردی
- (۵) هیپوتانسیون
- (۶) فیبریلاسیون بطنی
- (۷) بی‌اشتهایی
- (۸) آنمی همولیتیک

## توجهات پرستاری

- (۱) انفوزیون بایستی توسط پمپ انفوزیون یا سیستم میکرودریپ و تایمر انجام شود.
- (۲) تجویز وریدی دارو با اثرات نامطلوب قلبی بیشتری همراه است به ویژه هیپوتانسیون
- (۳) در مصرف طولانی مدت به صورت دوره‌ای EKG به عمل آورید و نیاز به ادامه درمان را ارزیابی کنید.
- (۴) در درمان فیبریلاسیون و فلوتر دهلیزی به دلیل اثرات واگولیتیک روی گره AV، ممکن است سرعت بطنی افزایش یابد، برای پیشگیری از این عارضه ممکن است قبل از تجویز دارو، یک گلیکوزید قلبی تجویز کنید.