

پروپرانولول هیدروکلراید

Propranolol Hydrochloride
® Inderal

گروه درمانی : ضد هیپرتانسیون، ضد آنژین، ضد آریتمی، درمان
کمکی در میگرن، درمان کمکی در MI

اشکال دارویی :

Injection" 1mg/ml

Tablets: 10mg, 20mg, 40mg, 80mg

Tablets (sustained - release): 80mg, 160mg

راه تجویز : IV/Po

اندیکاسیون

(۱) هیپرتانسیون

- (۲) اداره آنژین صدری
- (۳) آریتمی‌های فوق بطنی و دهلیزی
- (۴) تاکی آریتمی‌های ناشی از اثر بیش از حد کاتکولامین‌ها در طی بیهوشی
- (۵) هیپرتیرئیدی و فتوکروموسیتوما
- (۶) پیشگیری از سردرد میگرن یا سردرد عروقی مکرر، شدید، غیر قابل کنترل و آزار دهنده
- (۷) کاهش مرگ و میر بعد از MI
- (۸) درمان کمکی در اضطراب
- (۹) ترمورهای حرکتی اسنشیال، خانوادگی یا مرتبط با سن

کنتراندیکاسیون

- (۱) آسم برونکیال
- (۲) برادیکاردی سینوسی
- (۳) بلوک قلبی بیشتر از درجه اول
- (۴) شوک کاردیوژنیک

عوارض جانبی

- (۱) خستگی
- (۲) تب
- (۳) لتارژی
- (۴) برادیکاردی
- (۵) هیپوتانسیون
- (۶) لنگیدن متناوب
- (۷) یبوست
- (۸) برونکواسپاسم

توجهات پرستاری

- (۱) قطع مصرف دارو تدریجاً طی چند هفته صورت گیرد. توقف ناگهانی می‌تواند موجب بدتر شدن آنژین، تسریع MI یا هیپرتانسیون ریباند شود.

۲) پروپرانولول در درمان پرخاش، هراس حضور در صحنه، خونریزی مکرر گوارشی ناشی از سیروز و علایم یائسگی به کار رفته است.

۳) در فتوکروموسیتوما از تجویز پروپرانولول خودداری شود مگر این که قبل از آن داروی آلفا بلوکر تجویز کرده باشد.

۴) به بیمار توصیه کنید فرم آهسته رهش را همیشه با یا بدون غذا مصرف کند.