

پروتامین سولفات

Protamine Sulfate

گروه درمانی : آنتاگونیست هپارین

اشکال دارویی :

Injection:1000 UAH/ml(5ml)

راه تجویز : IV Infusion

اندیکاسیون

۱) مصرف بیش از حد هپارین. بالغین: دوز براساس بررسی‌های انعقادی خون وریدی تعیین می‌شود. 1mg پروتامین برای خنثی کردن 90u هپارین به دست آمده از نسج ریه یا 115u هپارین به دست آمده از مخاط روده، از راه وریدی تزریق

می‌شود. تزریق باید به صورت آهسته و در خلال یک تا ۳ دقیقه انجام شود. حداکثر دوز، 50mg در هر دوره ۱۰ دقیقه‌ای است

کنتراندیکاسیون

(۱) آلرژی به ماهی

عوارض جانبی

(۱) افت ناگهانی فشار خون

(۲) برادیکاردی

(۳) تنگی نفس

(۴) خونریزی

توجهات پرستاری

- (۱) از آن جایی که پروتامین نیمه عمر طولانی تر از هپارین داشته و همچنین خود نیز دارای اثرات ضد انعقادی است، دوزاز دارو را به دقت تعیین نمائید.
- (۲) فشار خون و نبض بیمار را هر ۳۰-۱۵ دقیقه یکبار حداقل تا ۳ ساعت بعد از تجویز هر دوز دارو کنترل کنید.
- (۳) تست‌های انعقادی را می‌توان ۱۵-۵ دقیقه بعد از تجویز پروتامین سولفات اندازه‌گیری کرد.