

رزپین

Reserpine ® sandril

گروه درمانی : ضد هیپرتانسیون

اشکال دارویی :

Tablets:0.1mg

راه تجویز : Po

اندیکاسیون

۱) هیپرتانسیون. بالغین: 0.1-0.25mg در روز

کنتراندیکاسیون

- (۱) حساسیت مفرط به دارو
- (۲) سنگ‌های صفراوی (احتیاط)
- (۳) افسردگی (احتیاط)

عوارض جانبی

- (۱) خواب‌آلودگی
- (۲) سردرد
- (۳) اضطراب
- (۴) آریتمی
- (۵) برادیکاردی
- (۶) درد قفسه سینه
- (۷) تنگی نفس

توجهات پرستاری

- ۱) به دلیل اثرات دارو، تنظیم دوزاژ در فواصل ۱۴-۷ روز صورت گیرد.
- ۲) برای کاهش عوارض گوارشی دارو با غذا یا شیر مصرف شود.
- ۳) مصرف رزپین از ۲ هفته قبل از الکتروشوک متوقف شود.
- ۴) طی مصرف دارو از انجام فعالیت‌های مخاطره آمیز نظیر رانندگی خودداری شود.
- ۵) در صورت وقوع افسردگی یا تغییر عادت خواب، به پزشک اطلاع دهید.