

سوتالول

Sotalol

گروه درمانی : ضد آریتمی

اشکال دارویی :

Tablets:40mg, 80mg

راه تجویز : Po

اندیکاسیون

۱) آریتمی‌های بطنی خطرناک با تشخیص قطعی. بالغین:

شروع با 80mg خوراکی دو بار در روز

۲) حفظ ریتم نرمال سینوسی (تاخیر در زمان عود فیبریلاسیون یا

فلوتر دهلیزی) در بیماران مبتلا به فیبریلاسیون یا فلوتر دهلیزی

علامت‌دار که اکنون دارای ریتم سینوسی هستند.

کنترل اندیکاسیون

- ۱) حساسیت مفرط به دارو
- ۲) اختلال شدید گره سینوسی
- ۳) برادیکاردی سینوسی
- ۴) بلوک AV درجه دو و سه بدون حضور پیس‌میکر مصنوعی
- ۵) شوک کاردیوورژن
- ۶) آسم برونکیال

عوارض جانبی

- ۱) ضعف
- ۲) گیجی
- ۳) سردرد
- ۴) آریتمی

(۵) بلوک AV

(۶) برادیکاردی

(۷) درد قفسه سینه

(۸) هیپوتانسیون

(۹) تپش قلب

(۱۰) تاکیکاردی

توجهات پرستاری

(۱) در شروع درمان یا تنظیم دوز ممکن است آریتمی‌هایی نظیر تاکیکاردی بطنی یا فیبریلاسیون بطنی روی دهد، لذا بیمار باید بستری باشد و تسهیلات پایش EKG مهیا باشد.

(۲) تنظیم دوز به آهستگی و بعد از گذشت ۶-۵ دوز از مصرف دارو صورت گیرد تا فاصله QT به خوبی مانیتور شده و سطوح پلاسمایی دارو به وضعیت ثابت برسد.

(۳) به بیمار هشدار دهید که مصرف دارو را به طور ناگهانی قطع نکند.

۴) در صورت فراموش کردن یک دوز از دو برابر کردن دوز بعدی
پرهیز شود.