

تریامترن - اچ

Triamterene-H

گروه درمانی : دیورتیک

اشکال دارویی :

Tablets: 25mg/50mg

راه تجویز : Po

اندیکاسیون

(۱) دوز. بالغین: ابتدا یک یا دو قرص از راه خوراکی، دوبار در روز بعد از غذا. حداکثر دوز روزانه نباید بیشتر از ۴ قرص باشد.

کنتراندیکاسیون

- (۱) پتاسیم سرم بالاتر از 5.5mEq/L
- (۲) مصرف همزمان با سایر دیورتیک‌های نگهدارنده پتاسیم
- (۳) آنوری
- (۴) نارسایی حاد و مزمن کلیه
- (۵) نفروپاتی دیابتیک

عوارض جانبی

- (۱) سرگیجه
- (۲) هیپوتانسیون
- (۳) حساسیت به نور
- (۴) زخم‌های دهانی
- (۵) هیپرکالمی
- (۶) آنافیلاکسی
- (۷) خشکی دهان

توجهات پرستاری

- (۱) به منظور کاهش بروز تهوع، دارو را همراه یا بعد از غذا تجویز کنید.
- (۲) در صورت مصرف طولانی مدت، قطع دارو باید تدریجی باشد.
- (۳) در خلال دوره تنظیم دوزاژ دارو، فشار خون بیمار را دقیقاً کنترل نمائید.
- (۴) میزان I/O بیمار را کنترل نمائید.
- (۵) در بیماران مستعد نارسایی کلیه، در خلال درمان آزمایشات بررسی عملکرد کلیه را به عمل آورید.
- (۶) تریامترن ممکن است باعث افزایش قند خون شود، بنابراین در بیماران مبتلا به دیابت باید با احتیاط کامل تجویز شود و قند خون بیمار در خلال درمان به دقت کنترل شود.