

آمیودارون

Amiodarone

گروه درمانی : ضد آریتمی فوق بطنی و بطنی

اشکال دارویی :

Inj:50 mg/ml
Scored Tab:200 mg

راه تجویز : IV/PO

اندیکاسیون

(۱) فیبریلاسیون بطنی راجعه و تاکیکاردی بطنی ناپایدار ،
فیبریلاسیون دهلیزی ، آنژین ۶۰۰-۸۰۰ mg روزانه
خوراکی .

(۲) تجویز دارو به فرم تزریقی : در ۲۴ ساعت اول ،
۱۵۰ mg به مدت ۱۰ دقیقه (در ۱۰۰ میلی لیتر D5W
مخلوط گردد) سپس ۳۶۰ mg به مدت ۶ ساعت (۹۰۰
میلی گرم در ۵۰۰ میلی لیتر D5W) و باقیمانده

(۷) اختلال دید

(۸) حساسیت به نور

توجهات پرستاری

(۱) برای تولید محلول انفوزین بارگیری اولیه و یا انفوزین تکمیلی ، ۳ml آمیودارون غلیظ ، با غلظت ۵۰mg/ml را به ۱۰۰ml از D5W اضافه کرده تا غلظت ۱/۵ mg/ml حاصل شود . برای تهیه محلول انفوزین آهسته یا نگهدارنده ، ۱۸ml آمیودارون غلظت اولیه را به ۵۰۰ml از D5W اضافه کرده تا محلول ۱/۸ mg/ml تهیه شود .

(۲) طی درمان وضعیت بینایی بیمار بررسی شود.

۱) 540 mg (با سرعت 5 mg/min در طی ۱۸ ساعت تزریق می شود .

۳) دیس ریتمی فوق بطنی

کنتراندیکاسیون

۱) اختلال شدید گرۀ سینوس

۲) برادیکاردی

۳) حاملگی

۴) شیردهی

۵) هیپوکالمی

۶) اختلال تیروئید

عارضه جانبی

۱) ضعف

۲) خستگی

۳) نوروپاتی محیطی

۴) برادیکاردی

۵) دیس ریتمی

۶) نارسایی قلبی