

بای پیریدین

Biperiden ® Akintone

گروه درمانی : ضد پارکینسونیسم ، آنتی کولینرژیک

اشکال دارویی :

Tab : 2 mg

Coated Tab : 4

Inj : 5 mg/ml

راه تجویز : IV slow/IM/PO

اندیکاسیون

(۱) پارکینسون : ۲mg ، خوراکی ۳ تا ۴ بار روزانه

(۲) درمان علایم اکستراپیرامیدال : ۲mg خوراکی ۲ تا ۳ بار روزانه

(۳) درمان بیماریهای اسپاستیک نامرتبط (آسیب نخاعی)

کنتراندیکاسیون

- (۱) مگا کولون
- (۲) BPH
- (۳) دیس ریتمی قلبی
- (۴) گلوکوم زاویه بسته
- (۵) زخم پپتیک
- (۶) MG
- (۷) حاملگی
- (۸) تشنج

عارضه جانبی

- (۱) سردرد
- (۲) سرگیجه
- (۳) آرتیاسیون
- (۴) بی قراری
- (۵) سایکوز
- (۶) هیپوتانسیون ارتواستاتیک
- (۷) یبوست
- (۸) هیپرترمی ، گرمزدگی

توجهات پرستاری

- (۱) دارو با غذا میل شود .
- (۲) تزریق IV باید به آهستگی انجام بشود و باید BP و نبض بیمار را کنترل نمود .
- (۳) بیمار باید از انجام کارهای مخاطره آمیز نظیر رانندگی پرهیزد.
- (۴) جهت جلوگیری از یبوست باید مصرف سبزیجات را افزایش داد .
- (۵) این دارو می تواند بیمار را مستعد گرما زدگی نماید بنابراین از فعالیت شدید در هوای گرم اجتناب شود .