

# بریتیلیوم تاسیلات

## Bretylium Tosylate

گروه درمانی : ضد آریتمی کلاس II , III

اشکال دارویی :

Inj.solu : 50 mg/ml (2,10,20ml)

راه تجویز : IM/IV Inf /IV

### اندیکاسیون

(۱) درمان دیس ریتمی بطنی : ۵۰۰mg از دارو را در ۵۰ml سرم DSW یا N/S رقیق نموده و توسط انفوزین وریدی در طی ۸ دقیقه (۵-۱۰mg/kg) داده می شود . بعد از ۱-۲ ساعت می توان دوز مربوطه را تکرار نمود و سپس هر ۸-۶ ساعت ادامه داد.

(۲) فیبریلاسیون بطنی : ۵mg/kg از فرم رقیق نشده دارو ، IV و سریع به عنوان دوز اولیه داده می شود تا حداکثر ۱۰mg/kg دوز

## کنترل اندیکاسیون

(۱) مصرف همزمان با دیگوکسین

(۲) تنگی آئورت

(۳) هیپرتانسیون ریوی

(۴) اختلال عملکرد کلیه

## عارضه جانبی

(۱) سرگیجه

(۲) سنکوپ

(۳) هیپوتانسیون وضعیتی

(۴) تهوع و استفراغ

(۵) بی اشتها

## توجهات پرستاری

(۱) این دارو را می توان بصورت رقیق نشده در فیبریلایسیون  
بطنی و یا رقیق شده با ۵۰ ml و یا بیشتر از D5W یا NS  
انفوزیون کرد

(۲) بیمار باید از تغییر وضعیت ناگهانی اجتناب بکند.

(۳) جهت جلوگیری از تهوع و استفراغ باید دارو به آرامی  
تزریق گردد.

۴) جهت جلوگیری از نکروز بافتی در تزریق IM، در هر محل کمتر از ۵ml تزریق شود.

۵) در صورت بروز chest pain سریعاً اطلاع دهد.

۶) نباید دارو را نزدیک اعصاب بزرگ تزریق کرد.

۷) باید تجهیزات لازم و پرسنل ورزیده مهیا باشد.