

سفازولین

cefazolin ®kefzol

گروه درمانی : آنتی بیوتیک، سفالوسپورین نسل اول

اشکال دارویی :

For Inj: 250,500mg,1g

راه تجویز : IM/IV

اندیکاسیون

(۱) درمان عفونتهای ادراری / ریوی / پوستی / استخوان و
مفاصل: ۲۵۰mg بصورت IM یا IV هر ۸ ساعت تا ۱g
هر ۸ ساعت

(۲) درمان سپتی سمی / آندوکاردیت

(۳) پروفیلاکسی قبل از عمل

کنتراندیکاسیون

(۱) حساسیت مفرط به سفالسپورینها

(۲) حساسیت مفرط به پنی سیلین ها

عارضه جانبی

(۱) سردرد

(۲) سرگیجه

(۳) یارستزی

(۴) بی حالی

(۵) تشنج

(۶) تهوع و استفراغ

(۷) کاهش اشتها

(۸) کرامپ شکمی

(۹) تنموس

(۱۰) دیس پیسی

توجهات پرستاری

(۱) تزریق عضلانی به صورت عمیق و در یک عضله بزرگ صورت گیرد.

(۲) هر یک گرم از دارو با ۱۰ml آب مقطر رقیق گردد.

۳) قبل از درمان از بیمار کشت و آنتی بیوگرام به عمل آید.

۴) دارو باید با فواصل مساوی مصرف گردد.

۵) تزریق عضلانی دارو ممکن است کمی دردناک باشد.

۶) برای کاهش خطر بروز ترومبوفلیت می توان دارو را با سرمهای N/S و یا D5W رقیق تر کرد.