

سفپیم

cefepime ® Maxipime

گروه درمانی : آنتی بیوتیک ، سفالوسپورین نیمه صناعی نسل سوم و چهارم

اشکال دارویی :

Inj : 500mg,1g,2g

راه تجویز : IV / Inf / IM

اندیکاسیون

(۱) درمان عفونتهای خفیف تا متوسط مجاری ادراری ناشی از E.coli، کلبیسلا، پنومونی، پروتئوس میرابیلیس : ۲g انفوزین وریدی در طی ۳۰ دقیقه هر ۱۲ ساعت به مدت ۱۰ روز

(۲) درمان پنومونی متوسط تا شدید

(۳) عفونت شدید مجاری ادرار شامل پیلونفریت

- (۴) عفونت داخل شکمی
- (۵) عفونتهای پوستی بدون عارضه ناشی از استرپتوکوکها و استافیلوکوکها

کنتراندیکاسیون

- (۱) حساسیت مفرط به سفالسپورین
- (۲) اختلال عملکرد کلیه

عارضه جانبی

- (۱) تب
- (۲) سردرد
- (۳) فلیت
- (۴) کولیت
- (۵) تهوع
- (۶) کاندیدیازیس
- (۷) واژینیت
- (۸) راش
- (۹) التهاب

توجهات پرستاری

- (۱) تزریق عضلانی تا حدودی دردناک می باشد
- (۲) در مواردی که سمیت کلیوی مانند نفریت بینابینی و مخصوصاً نکروز توبولی با دارو ایجاد شود، مصرف دارو باید سریعاً متوقف گردد.