

سفیکسیم

cefixime ® cephoral

گروه درمانی : آنتی بیوتیک ، سفالوسپورین نسل سوم

اشکال دارویی :

Scored F.C Tab : 200,400mg

Ped sup : 100mg/sachet/5ml

(وارداتی) susp : 100mg / sachet / 5ml

راه تجویز : PO

اندیکاسیون

(۱) درمان عفونتهای ادراری / اوتیت مدیا /

(۲) درمان سوزاک بدون عارضه

(۳) درمان برونشیت حاد و مزمن

(۴) درمان فارنژیت و تونسیلیت :
۲۰۰mg روزانه ۲ بار در روز

کنتراندیکاسیون

- (۱) حساسیت مفرط به سفالسپورین ها
- (۲) اختلال عملکرد کلیه

عارضه جانبی

- (۱) درد شکم
- (۲) کاهش اشتها
- (۳) تهوع و استفراغ
- (۴) نفخ
- (۵) عصبانیت
- (۶) خستگی
- (۷) بی حالی
- (۸) کهیر
- (۹) خارش

توجهات پرستاری

- (۱) در اویتت مدیا مصرف سوسپانسیون این دارو ارجح است.
- (۲) برای کاهش مشکلات گوارشی بهتر است دارو به همراه غذا یا شیر میل شود.

۳) در نارسایی کلیه و افراد مسن ، احتمال سمیت کلیوی این دارو بیشتر است.